

藥劑

殺虫剤の殺虫効力

ピレスロイド剤

ピレスロイド剤	対象昆虫	イエバエ成虫		アカイエカ成虫		チャバネゴキブリ成虫			急性 経口毒性 LD50値	魚毒性 コイ稚魚
	試験方法	微量滴下法 による	噴霧降下法 による	微量滴下法 による	ガラス箱噴霧 法による	微量滴下法 による	継続接触法 による			
		LD50 μg/1匹	KT50 (分)	LD50 μg/1匹	KT50 (分)	LD50 μg/1匹	KT50 (分)			
一般名	商品名								マウス mg/kg	TLm (ppm)
ジョチュウグイクエクス	ピレトリン	0.59	2.1	0.037	2.2	1.15	22		273-796	0.08
エトフェンブロックス※ ¹	ベルミトール	0.018	4.2	0.004	6.2	0.22	8		> 100,000	5.0
d l・d T80アレスリン	ピナミンフォルテ	0.77	2.1	0.050	3.0	1.21	-		-	-
フタルスリン	ネオピナミン	0.71	1.6	0.21	2.0	3.33	100		5,200	0.28※ ²
レスメトリン	クリスロン	0.044	6.8	0.012	7.2	0.80	100		> 3,375	0.14
d-T80レスメトリン	クリスロンフォルテ	0.038	5.1	-	-	0.26	37		-	-
フラメトリン	ピナミンD	0.27	3.2	0.031	4.2	6.98	26		5,900	0.46
d-T80フラメトリン	ピナミンDフォルテ	0.14	2.3	0.019	2.2	1.75	-		-	<1.0※ ²
フェノトリン	スミスリン	0.048	8.7	0.007	16.3	0.89	38		> 10,000	0.17※ ²
ペルメトリン	エクスミン	0.044	12.6	0.008	23.0	0.64	19		540-650	-

※¹ ピレスロイド様化合物 ※² キンギョ

有機リン剤

有機リン剤	対象昆虫	イエバエ成虫		アカイエカ成虫	チャバネゴキブリ成虫	アカイエカ幼虫	センチクニバエ成虫		急性 終口毒性 LD50値	魚毒性 コイ稚魚
	試験方法	微量滴下法による	継続接触法による	微量滴下法による	微量滴下法による	希釈液内継続接触法による	モミガラ浸漬法による			
		商品名	LD50 μg/1匹	KT50 (分)	LD50 μg/1匹	LD50 μg/1匹	LC50 (ppm)			
一般名										
クロロピリホスメチル	ザーテル	0.053	24	0.00081	0.245	0.001	1.5		2,254	9.4※1
カルクロホス	クレカルビン	0.031	5	－	0.26	0.12	－		330	－
ジクロルボス	DDVP	0.031	3.76	0.0039	0.15	0.032	3 ～ 10		124	> 40
ダイアジノン	ダイアジノン	0.091	23.9	0.010	0.39	0.039	8 ～ 12		120	3.2
デメホス	アベイト	－	－	－	－	0.00066	－		1,196	8
トリクロルホン	ディブテレックス	0.27	360	0.054	1.9	0.1	5.6		660	6.2
プロパタンホス	サフロチン	0.088	－	－	0.435	0.00496	－		98.8※2	5.9
ピリダフェンチオン	オフナック	0.13	180	0.028	0.6	0.1	－		424	12.0
フェントロチオン	スミチオン	0.065	101	0.00195	0.25	0.0068	3.1		1,030	4.4
フェンチオン	パイテックス	0.071	> 95.1	0.002	0.33	0.0024	2.9		227	2.0
ブロモホス	ブロモホス	0.62	> 120	－	1.33	0.12	－		5,850	－
マラチオン	マラソン	0.59	289	0.011	0.48	0.048	50 ～ 80		3,300	4.5
プロチオホス	トヨチオン	0.30	315	0.015	－	0.0042	4.1		940	9.5

※1 ヒメダカ ※2 ラット

その他

その他	対象昆虫	50%羽化阻止濃度		急性経口 マウス	48 TLM コイ		※ 備 考
		アカイエカ 終令幼虫	イエバエ 終令幼虫				
一般名	商品名	ppm	ppm	mg/kg	ppm		
ジフルベンズロン	デミリン	0.00023	0.12	> 10,000	>100		脱皮阻害剤
メトプレン	アルトシッド	0.0003 ~ 0.00054	-	> 10,000	>51.7		幼若ホルモン様物質
ピリプロキシフェン	スミラブ	-	-	> 1,000	>0.63		〃

殺虫剤の選び方

[illegible]

薬 剤

ベイト剤

■ マックスフォース ジェルK



PMPを満足させる3つのメリット
医薬品のベイト剤
PMP専用剤
ゴキブリが食い飽きしない



PMP専用
医薬品

輸入
[製造販売元] **バイエルクロップサイエンス株式会社**
防府工場 山口県防府市新田築地2061



- 有効成分 ヒドラメチルノン 2.15g(100g中)
- 効能・効果 ゴキブリの駆除
- 包装 30g(4本入×10箱)／250g(10本入)
- 用法・用量 本品を、ゴキブリの発生の程度により1～2g/㎡の割合で、ゴキブリの出没する場所(例えば飲食店の調理場、事務所、工場、倉庫、ゴミ貯蔵所等)において、壁の隙間、冷蔵庫の下・裏、棚等の水のかからない場所に、人が直接触れないように適切な器具等を用いてスポット処理をする。1スポットは 0.25～0.5gとし、なるべく小さなスポットで多数の箇所に処理する。
- 安全性 (ヒドラメチルノンとして)
 - 急性経口毒性 LD₅₀:1,300mg/kg(ラット♀)
 - 魚毒性 LC₅₀:0.39mg/L(コイ 48h)ヒドラメチルノンは蒸気性が低く、吸入による危険性はありません。

ベイト剤

納期記号	商品コード	商品名	成分	容量	発注単位	区分	希釈倍率、用量、その他
	0006657	マックスフォースジェルK	ヒドラメチルノン2.15%	30g×40本	1	医	1～2 g/㎡
	0006658	マックスフォースジェルK	ヒドラメチルノン2.15%	250g×10本	1	医	1～2 g/㎡
	0006644	マックスフォースG	ヒドラメチルノン1.5%	12個	24	外	1～2個/㎡
	0006675	サブターフェュージ	ヒドラメチルノン2.15%	30g×30本	1	医	1～2 g/㎡
	0006671	グリアートセレクト(バイエル)	フィプロニル 0.05%	30g×4本	1		0.4～0.8 g/㎡
	0006681	ジーオーケー1・クイック(フマキラー)	ジノテフラン	30g×10本	1		1～2 g/㎡
	0006643	マルカバグベイト21	N-アルキルアミド系化合物	30g×5本	1		1～2 g/㎡
	0005291	アントロール(アースバイオケミカル)	ヒドラメチルノン	200g	1		2～3gを数箇所

■ サブターフェュージ



■ ゴキブリ駆除用ベイト剤 **医薬品**

喫食率を向上させベイトアバージョンを防ぐ新処方ベイト剤

〈有効成分〉 ヒドラメチルノン2.15g(100g中)
〈効能又は効果〉 ゴキブリの駆除



- 有効成分 ヒドラメチルノン 2.15g(100g中)
- 効能・効果 ゴキブリの駆除
- 内容量 30g×5本入り×6箱入り
- 用法・用量 壁の隙間、棚や冷蔵庫の裏等の水のかからない場所に1㎡につき1～2gの割合で、適切な器具などによりスポット処理をする。
- 使用上の注意 (1)本品は業務用です。
(2)定められた用法及び用量を守って使用してください。
(3)幼少児の手の届かない、直射日光の当たらない乾燥した涼しい場所に保管してください。
(4)使用の際には、ラベルをよく読んで正しくお使いください。

〈サブターフェュージの製剤毒性試験結果〉

試験の種類	動物種	投与法	試験結果
急性毒性試験	ラット	経口	LD50=♂ ♀ >2000*(mg/kg)
	ラット	経皮	LD50=♂ ♀ >2000*(mg/kg)
局所刺激性試験	ウサギ	眼	刺激性なし

製造販売元 **BASFアグロ株式会社**
愛知県田原市六連町神ヶ谷16-1



薬 剤

エアゾール、消臭・殺菌剤、防虫シート、樹脂蒸散剤

金鳥プロ用ゴキブリ駆除剤



特 長 ゴキブリを直撃ノックダウン

速効性にすぐれたイミプロトリンと残効性を備えたフェノトリンの混合エアゾールです。
水性プロ用ゴキブリ駆除剤は、「VOC」の放出量を削減した水性処方です。
火気に対する危険性が低くなっています。

使用法

害虫に直接噴射する場合は、約60cm以内の距離から1～3秒間噴射して下さい。
害虫の潜み場所やその周辺、通路と思われる場所に15～30cmの距離から帯状に、
十分ぬれる程度〔1㎡当たり約45～60秒間（約20～30mL）〕噴霧塗布して下さい。
（例）ゴキブリ……流し台、冷蔵庫の裏等
トコジラミ（ナンキンムシ）……柱の割れ目、ベッドのすき間等
割れ目、すき間の処理は便利な金属ロングノズルを使用して下さい。

成分： イミプロトリン、フェノトリン 対象： ゴキブリ、トコジラミ（ナンキンムシ） 容量： 420mL 区分： 医薬部外品

キルテックスA90



浄化槽用薬剤

害虫の好む食物に殺虫成分を配合し、摂取させて害虫を駆除するものです。

特 長

昆虫だけに作用して、羽化を阻止するIGR（昆虫成長制御）剤と、速効性のピレスロイド剤を主成分とすることで、チョウバエの成虫だけでなく、蛹・幼虫をも駆除します。

有効成分： ビリプロキシフェン、d-T80-フタルスリン、d-T80-レスメトリン

PGガード



窓ガラス用殺虫剤

特 長

ガラス面に噴霧するだけで、ガラス面によって寄ってくる昆虫を殺虫・忌避します。
ガラス面に噴霧しても、透明感が損なわれることはなく、効果は約1ヶ月間持続します。

使用法

窓ガラスの屋外面に使用します（ガラス面のみに使用してください）
噴霧対称箇所面を清掃してください（雑巾による水拭き後カラ拭きをして下さい）
ノズルを噴霧面から30cm程度離して、均一に濡れる程度噴霧して下さい。
噴霧量の目安は1㎡あたり6秒です。1本あたりの噴霧可能面積は20㎡前後です。
噴霧後30分程度で乾きます。乾くまでさわらないで下さい。

有効成分： ピレスロイド系殺虫剤他

バボナ殺虫プレート



樹脂蒸散剤の定番

特 長

つるだけで、ハエ・蚊・ゴキブリを殺虫します。
レギュラーサイズは6～8畳の広さに1枚つるします。
効きめは2～3ヶ月の長期間に渡って持続します。
店舗やホテル、旅館、倉庫、マンション等の
ごみ置き場、畜舎などの使用に適しています。

エアゾール

納期記号	商品コード	商品名	成分	容量	発注単位	区分	希釈倍率、用量、その他
	0006355	金鳥プロ用ゴキブリ駆除剤	イミプロトリン、フェノトリン	420mL	30	㊟	
	0006358	金鳥水性プロ用ゴキブリ駆除剤	イミプロトリン、フェノトリン	420mL	30	㊟	VOC対策商品
	0006531	PGガード（フマキラー）	ピレスロイド系殺虫剤、ディート	450mL	6		窓ガラス用殺虫剤、約1ヶ月持続
	0006620	フマキラー-FK2001	イミプロトリン、フェノトリン	450mL	30		
	9290065	カメムシキンチョール	シラフルオフェン、フェノトリン	300mL	20		カメムシ、ウンカ、ヨコバイ用
	0006360	チャドクガ防除剤（金鳥）	アクリル樹脂	180 mL	20		固着剤によりチャドクガ幼虫を動けなくする物理的防除
	0006533	キルテックスA90（フマキラー）	※備考参照	300mL	20		用量：10～20秒噴霧／浄化槽 ※ビリプロキシフェン d-T80-フタルスリン d-T80-レスメトリン

消臭・殺菌剤

納期記号	商品コード	商品名	成分	容量	発注単位	区分	希釈倍率、用量、その他
	0005521	三共ファインドール	金属錯塩 他	18L	1	㊹	希釈倍率：10～20倍 ごみ処理場等の消臭
	0005413	テゴークイント10%（アズウェル）	7-ヒドロキシ-2-イソクイナゾリン-4(1H)-オン混合物	10kg	2	㊹	希釈倍率：100倍 食品工業用除菌剤
	0005414	テゴークイント25%（アズウェル）	7-ヒドロキシ-2-イソクイナゾリン-4(1H)-オン混合物	5kg	2	㊹	希釈倍率：250倍 食品工業用除菌剤
	0005405	グリコエタノールE&F88E	エタノール	18L	1	㊹	原液

防虫シート

納期記号	商品コード	商品名	成分	容量	発注単位	区分	希釈倍率、用量、その他
	0006631	防虫シートムツシツシ（業務用）	ピレスロイド系殺虫剤混入	1畳×50/本	1本		

樹脂蒸散剤

納期記号	商品コード	商品名	成分	容量	発注単位	区分	希釈倍率、用量、その他
	0006501	バボナ殺虫プレート	ジクロロボス 21.39 g	115g	100	㊹	1枚/6～8畳の広さ
	0006530	チャップリン	エンベントリン	25.8g*	100		1枚/㎡（下記以外の浄化槽） *外装込
	0006529	チャップリンハーフ	エンベントリン	15.8g*	100		1枚/㎡（容積1㎡未満の単独浄化槽） *外装込