

薬 剤

ドライ施工、くん煙剤

ドライ施工

有効成分が液化炭酸ガスに希釈されており、薬剤そのものが強力な噴霧剤となっているため、噴霧に動力を必要と
しません。水、油、有機溶剤、界面活性剤等を使用していないため、溶媒臭や濡れ等の汚れが少ないです。

ミラクンS



有効成分： フェノトリン 1 %

用法・用量

対象害虫	投薬量	処理時間
ゴキブリ	10g/m ³	4時間
ハエ・カ幼虫	1g/m ³	30分
屋内塵性ダニ	5g/m ³	4時間

詳細は、96頁参照下さい。

ドライ施工

納期記号	商品コード	商品名	成分	容量	発注 単位	区分	希釈倍率、用量、その他
	0006408	ミラクンS 2.4kg	フェノトリン 1 %	2.4kg	1	(医)	(ゴキブリ) 10 g/m ³ ・4 時間 (ハエ・カ幼虫) 1 g/m ³ ・30分
	0006407	ミラクンS 7kg	フェノトリン 1 %	7kg	1	(医)	(ゴキブリ) 10 g/m ³ ・4 時間 (ハエ・カ幼虫) 1 g/m ³ ・30分
	0006409	ミラクンGX 2.4kg	d・d-T-シフェノトリン0.6%	2.4kg	1	(医)	(ゴキブリ) 10 g/m ³ (ハエ・カ幼虫) 0.5～1.0 g/m ³
	0006410	ミラクンGX 7kg	d・d-T-シフェノトリン0.6%	7kg	1	(医)	(ゴキブリ) 10 g/m ³ (ハエ・カ幼虫) 0.5～1.0 g/m ³

くん煙剤

納期記号	商品コード	商品名	成分	容量	発注 単位	区分	希釈倍率、用量、その他
	0006151	アースレッドW 12～16畳	メトキシジアゾン12.0 % d・d-T-シフェノトリン3.0%	20g	30	(医)	(ゴキブリ、ダニ、ノミ) 12～16畳／筒
	0006152	アースレッドW 18～24畳	メトキシジアゾン12.0 % d・d-T-シフェノトリン3.0%	30g	20	(医)	(ゴキブリ、ダニ、ノミ) 18～24畳／筒
	0006153	アースレッドW 30～40畳	メトキシジアゾン12.0 % d・d-T-シフェノトリン3.0%	50g	10	(医)	(ゴキブリ、ダニ、ノミ) 30～40畳／筒
	0006154	アースレッドW 60～80畳	メトキシジアゾン12.0 % d・d-T-シフェノトリン3.0%	100g	12	(医)	(ゴキブリ、ダニ、ノミ) 60～80畳／筒
	0006155	フマキラー霧ダブルジェット フォグロンS	メトキシジアゾン1g/100mL d・d-T-シフェノトリン0.25g/100mL	100mL	30	(医)	(ゴキブリ、ノミ) 6～12畳／筒
	0006156	フマキラー霧ダブルジェット フォグロンS	メトキシジアゾン1g/100mL d・d-T-シフェノトリン0.25g/100mL	200mL	30	(医)	(ゴキブリ、ノミ) 12～24畳／筒
	0006157	フマキラー霧ダブルジェット フォグロンD	安息香酸ベンジル3g/100mL d・d-T-シフェノトリン0.25g/100mL	100mL	30	(医)	(ダニ、ノミ) 6～12畳／筒
	0006158	フマキラー霧ダブルジェット フォグロンD	安息香酸ベンジル3g/100mL d・d-T-シフェノトリン0.25g/100mL	200mL	30	(医)	(ダニ、ノミ) 12～24畳／筒
	0006183	バルサンPジェット3号	ベルメトリン 5 %	120g	40	(医)	(ゴキブリ、イエダニ、ノミ) 1 0 0 ～1 3 3 m ³ ／筒 (ハエ・カの成虫) 2 0 0 ～4 0 0 m ³ /筒
	0006182	バルサンPジェット2号	ベルメトリン 5 %	240g	12	(医)	(ゴキブリ、イエダニ、ノミ) 2 0 0 ～2 6 7 m ³ ／筒 (ハエ・カの成虫) 4 0 0 ～8 0 0 m ³ /筒
	0006181	バルサンPジェット1号	ベルメトリン 5 %	480g	12	(医)	(ゴキブリ、イエダニ、ノミ) 4 0 0 ～5 3 3 m ³ ／筒 (ハエ・カの成虫) 8 0 0 ～1 6 0 0 m ³ /筒

アースレッドW



有効成分： メトキシジアゾン12.0 %
d・d-T-シフェノトリン3.0 %

フマキラー霧ダブルジェット
フォグロンS、フォグロンD



○フォグロンS

対象害虫： ゴキブリ・ノミ用
有効成分： メトキシジアゾン
d・d-T-シフェノトリン

○フォグロンD

対象害虫： ダニ・ノミ用
有効成分： 安息香酸ベンジル
d・d-T-シフェノトリン

バルサンPジェット



有効成分： ベルメトリン 5 %

薬 剤

MC剤、水性乳剤

ダイアジノンMC懸濁剤(三共)



成分：ダイアジノン 23%
対象：ゴキブリ、ノミ、イエダニ
容量：4 L
区分：医薬品

マイクロカプセルが可能にした
高い持続効果と安全性

特長

- ①安全性が高い
- ②効果が長期間持続(高分子膜でマイクロカプセル化)
- ③食毒効果+接触毒効果で効力を発揮
- ④消防法上の非危険物

ダイアジノンMC懸濁剤の安全性

	マウス経口LD ₅₀	ラット経口LD ₅₀	ラット経皮LD ₅₀	急性毒性LC ₅₀ (43hr)
急性 毒性	>40mg/kg (原体換算:320mg/kg)	>40mg/kg (原体換算:320mg/kg)	>40mg/kg (原体換算:320mg/kg)	>46ppm

お勧め



せっかくの高い持続効果を
ダメにいませんか？
アクチゾールなら壁の中や
隙間の奥深くに薬剤を到達
させられるので成分の分解
やマイクロカプセルの破壊
が少なくて済みます。

ベルミートル水性乳剤(三共)



成分：エトフェンプロックス 7%
対象：ゴキブリ、ノミ、イエダニ
トコジラミ、ハエ・カの成虫
容量：4 L / 18 L
区分：医薬部外品

特長

- ①殺虫性が高く、速効性に優れる。
- ②ほ乳類に対して非常に安全性が高い。
- ③有機溶剤による臭気や刺激がない。
- ④引火性がない。(消防法上の非危険物)
- ⑤有効成分エトフェンプロックスは揮散しにくい。
(常温ではほとんど空气中に揮散しない)

エトフェンプロックスの安全性

	マウス経口LD ₅₀	ラット経口LD ₅₀
急性 毒性	> 107,200mg/kg	> 42,880mg/kg

MC剤

納期記号	商品コード	商品名	成分	容量	発注 単位	区分	希釈倍率、用量、その他
	0006340	金鳥ゴキブリ用スミチオンMC	フェントロチオン20%	4kg	1	(医)	希釈倍率：40～80倍 用量：50mL/m ²
	0006622	フマキラーゴキブリ用スミチオンMC	フェントロチオン20%	4kg	2	(医)	希釈倍率：40～80倍 用量：50mL/m ²
	0006059	ダイアジノンMC懸濁剤(三共)	ダイアジノン23%	4L	1	(医)	希釈倍率：23～46倍 用量：50mL/m ²

水性乳剤

納期記号	商品コード	商品名	成分	容量	発注 単位	区分	希釈倍率、用量、その他
	0006046	ベルミートル水性乳剤(三共)	エトフェンプロックス7%	4L	2	(外)	希釈倍率：10倍(残留噴霧) 50～100倍(直接噴霧) 用量：50mL/m ²
	0006045	ベルミートル水性乳剤(三共)	エトフェンプロックス7%	18L	1	(外)	希釈倍率：10倍(残留噴霧) 50～100倍(直接噴霧) 用量：50mL/m ²
	0006535	フマキラーサニタリーEP水性乳剤	エトフェンプロックス7%	18L	1	(外)	希釈倍率：10倍(残留噴霧) 50～100倍(直接噴霧) 用量：50mL/m ²
	0006031	三共スミスリン乳剤	フェノトリン10%	18L	1	(外)	希釈倍率：5～10倍 用量：50mL/m ²
	0006041	三共エクスマン乳剤(水性)	ベルメトリン5%	18L	1	(外)	希釈倍率：10～20倍 用量：50mL/m ²
	0006536	フマキラーフマテックス水性乳剤	フェンチオン5%	18kg	1	(医)	希釈倍率：5～10倍 用量：50mL/m ²
	0006303	金鳥ULV乳剤S	フェノトリン10%	1L	1	(医)	希釈倍率：2～4倍 用量：2～4mL/m ²
	0006302	金鳥ULV乳剤S	フェノトリン10%	6L	1	(医)	希釈倍率：2～4倍 用量：2～4mL/m ²
	0006301	金鳥ULV乳剤S	フェノトリン10%	18L	1	(医)	希釈倍率：2～4倍 用量：2～4mL/m ²
	0006313	金鳥ULV乳剤E	ベルメトリン5%	1L	1	(医)	希釈倍率：2～4倍 用量：2～4mL/m ²
	0006312	金鳥ULV乳剤E	ベルメトリン5%	6L	1	(医)	希釈倍率：2～4倍 用量：2～4mL/m ²
	0006311	金鳥ULV乳剤E	ベルメトリン5%	18L	1	(医)	希釈倍率：2～4倍 用量：2～4mL/m ²

金鳥ULV乳剤S



特長

広い範囲の衛生害虫に有効で、すぐれた速効性と致死効力を合わせ持ち、特に
安全性が高いため、病院、ホテル、食品工場、車輦、船舶などのULV施用に安心
して使えます。

成分：フェノトリン10%(W/W)
対象：ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ
用法：害虫の生息している場所に、原液のまま、または水で希釈し、ULV噴霧器で20ミクロン
以下の薬剤粒子にして空間噴霧します。噴霧後、屋内を4～6時間(できれば一夜)密閉し
て下さい。
容量：1L, 6L, 18L(写真は、6L)

適用害虫	希釈倍率	使用量
ハエ成虫、 蚊成虫、 ゴキブリ、 ノミ、 トコジラミ、 (ナンキンムシ)、 イエダニ	原液	1m ² あたり0.4mL (高さ2.5mとして床面積1m ² あたり1mL)
	2倍	1m ² あたり0.8mL (高さ2.5mとして床面積1m ² あたり2mL)
	4倍	1m ² あたり0.4mL (高さ2.5mとして床面積1m ² あたり4mL)