

薬 剤

粉剤

不快害虫の生態

三共シャットアウトSD



成分：有機リン剤、カーバメイト剤配合
対象：歩行性不快害虫
容量：3 kg
区分：雑品

アリ
ヤスデ
ワラジムシ
ダンゴムシ
ムカデ
ゲジ
などの不快害虫防除に！！

特長

- ①歩行性不快害虫防除の専門薬です。
- ②すぐれた効果と効力の持続性に富んでいます。
- ③重質粉剤ですから散布中に空中へ飛散しにくくなっています。

お勧め



ミゼットダスター

軒下や室内等の
小さい範囲に！



B&G
エレクトリックダスター

天井裏等の
大きな範囲に！

粉剤

納期記号	商品コード	商品名	成分	容量	発注 単位	区分	希釈倍率、用量、その他
	0006094	三共シャットアウトSD	有機リン剤、カーバメイト剤配合	3kg	4		用量：帯状散布 5cm幅、1.5 0 g/m ² 発生源 2.0～3.0 g/m ² 歩行性不快害虫用
	0006652	ポリド(米国ウォーターベリー)	ホウ酸	454g	12		用量：適量 歩行性不快害虫用



藥劑

殺鼠剤

■ ■ スーパーデスマア



第二世代の殺鼠剤

通常のネズミで1回、薬剤耐性のネズミでも数回の喫食で効果がでます。
※1回の喫食で効きますが、効果が現れるまでに、喫食後数日かかります

有効成分： ジフェチアロール0.0025%

対象： ネズミ

容量： 500 g

使用法

ネズミのよく出る場所数箇所に、適量（約10g～30g）を設置します。
本品のなくなったところには補充し、食べなくなるまで続ける。

喫食性の悪い場合の対処法

ネズミは警戒心が強く、使用環境によっては初めてのエサをなかなか食べない場合があります。そのような場合には下記の使用例を参考に工夫してご使用頂くことをおすすめします。

○殺鼠剤を使用する際の工夫

- 一被害の出た所や姿をよく見かける所に数多く設置する
- 一被害のあった食べ物を粉にしてふりかける
- 一コーン油、ソース、食用酢、牛乳等を少々ふりかける

○食物を出したままにしない

殺鼠剤

納期記号	商品コード	商品名	成分	容量	発注単位	区分	希釈倍率、用量、その他
	0005354	スーパーデスマオ(アース製薬)	ジフェチアロール 0.0025%	500g	1	⑥	第二世代のクマリン系
	0005355	デスマオプロトレタイプ(アース製薬)	ジフェチアロール 0.0025%	15g×4	20	⑥	第二世代のクマリン系
	0005356	デスマオプロ 投げ込みタイプ(アース製薬)	ジフェチアロール 0.0025%	5g×12	20	⑥	第二世代のクマリン系
	0005324	エンドックス(バイエル)	クマテトラリル 0.75%	1kg	1	⑥	
	0005360	エンドックス(バイエル)	クマテトラリル 0.75%	10kg	1	⑥	
	0005346	フマキラーラニラットF	プロマジオロン 0.005%	5kg×2	1	④	第二世代のクマリン系
	0005326	タニサケチューモア・コンク粉剤	ワルファリン1%、海葱0.2%、穀類粉末等98.8%	1kg	10	⑧	ピンク色の粉末です
	0005331	タニサケチューモア・ブロック	ワルファリン0.1%、穀物粉末・パラフィン等99.9%	※	100	⑥	下水道や排水溝に最適な防水型 ※容量> 60g×2/個
	0005340	大塚薬品工業粉末ラテミン	ワルファリン1%	10kg	2	⑧	貯穀倉庫にも使えます
	0005342	大塚薬品工業水溶性ラテミン錠	ワルファリン2%	20錠	30	⑧	用量：投与器に6～7錠を水に溶かして使用 貯穀倉庫にも使えます
	0002221	大塚薬品工業ラテミン投与器			10		プラスチック製、200ml容器

■ ■ ■ エンドックス(バイエル)



成 分：クマテトラリル 0.75%

対 象：ネズミ 容量： 1kg

区分：医薬部外品

使用法：粉のまま通路や隠れ場に撒くか餌と混ぜて使います。

○食物の嗜好性

生息する場所により異なり、決定的なものはない。ことに、巣の中に運んだ食物等は常に新しい物から食べるので、古いものはいつでも残される。毒餌の効果を期待する場合は環境から、食物を出るだけ完全になくし、少量ずつ投与することが望ましい。



簡単に効果のある毒餌のつくり方

準備するもの	一般家庭の基準量
殺そ剤 エンドックス	20 g (茶さじ約5杯)
生のサツマイモを1cm角に切ったもの	200個
乾燥したパン粉	約5握り
天ぷらかす (無い場合はサラダオイル少々)	約3握り
厚めのビニール袋 (新聞の半分位の大きさ)	1枚

喫食率をアップさせたり、誤食を防ぐために、
ベイトボックスや毒餌
皿を利用しましょう！



ネズミの防除指標（一例）

7日間に接種された米ヌモの数		
割合	米ヌモの数	米ヌモの数
低い	0	0
少ない	1	1~10
中程度	2	11~25
多い	3	>25

米ヌモの数=7日間12の箇に属した米ヌモの数。
 最も多いのが少ないです。最も多いのは下の2に属して、7日以上もしくは「1」未満に属した米ヌモの数とする。

$$\text{会期に属した米ヌモの数} \div \text{確認して、思の数} \div \text{日数} \times 12 \times 7$$

