

薬 剤

土壌処理用防蟻剤（乳剤、FL剤、MC剤、水溶剤）

ハチクサンFL



特 長

ネオニコチノイド系の非忌避性の殺虫剤なので、シロアリを効果的に薬剤へ接触させ、確実に致死させる“ドミノ効果”を発現します。
低濃度で高い効果が得られ、長期間の防蟻効果が期待できます。
殆ど臭いを感じない為、居住者及び建築作業者に対し不快感を与えず、また散布作業者にも優しい薬剤です。

有効成分： イミダクロプリド20％
容 量： 1 kg
希釈倍率： 200倍
認 定：（社）日本しろあり対策協会
（社）日本木材保存協会

ミケブロック



特 長

「ミケブロック」は石油系溶剤を使用しない顆粒水溶剤であるため、希釈液はほとんど臭い・刺激がありません。「三共ミケブロック乳剤」は水で100倍に希釈して使用するため、限りなく水ベースに近く、臭い・刺激を最大限に抑えました。

有効成分： ジノテフラン20％
容 量： 2kg
希釈倍率： 100倍
認 定：（社）日本しろあり対策協会
（社）日本木材保存協会

土壌処理用殺蟻剤（乳剤）

納期記号	商品コード	商品名	成分	容量	発注単位	区分	希釈倍率、用量、その他
	0005018	三共メトロフェン乳剤	エトフェンブロックス8%,S-421 40%	18L	1	㊦㊧	希釈倍率：40倍
	0005270	金鳥シロネン乳剤S	シラフルオフェン3%,S-421 6%	18L	1	㊦㊧	希釈倍率：30倍
	0005269	金鳥シロネン乳剤A(水性乳剤)	シラフルオフェン1 5%	3L	2	㊦㊧	希釈倍率：100倍
	0005180	フマキラーホルサー乳剤(低臭性)	ペルメトリン8%,MGK264 40%	18L	1	㊦㊧	希釈倍率：40倍
	0005181	フマキラーエコロフェン乳剤(低臭性)	エトフェンブロックス3 0%	4kg	2	㊦㊧	希釈倍率：75倍

土壌処理用殺蟻剤（FL剤・MC剤・水溶剤）

納期記号	商品コード	商品名	成分	容量	発注単位	区分	希釈倍率、用量、その他
	0005294	ステルスSC(BASF)	※備考参照	1L	1	㊦㊧	希釈倍率：2 0 0 倍 FL剤 ※成分>4-プロモ-2-(4-クロロフェニル)-1-エトキシメチル-5-トリフルオロメチルピロール-3-カルボニトリル
	0005210	ハチクサンFL	イミダクロプリド2 0 %	1kg×10	1	㊦㊧	希釈倍率：2 0 0 倍 FL剤
	0005014	ミケブロック(土壌用)(三共)	ジノテフラン2 0 %	2kg	1	㊦㊧	希釈倍率：1 0 0 倍 水溶剤
	0005080	アジェンダSC(三共)	フィプロニル9, 1%	1kg	1	㊦㊧	希釈倍率：300倍 FL剤
	0005031	三共グレネードMC	フィプロニル2%,プラレトリン1%	4kg	1	㊦㊧	希釈倍率：125倍 MC剤
	0005182	フマキラーグレネードMC	フィプロニル2%,プラレトリン1%	4kg	1	㊦㊧	希釈倍率：125倍 MC剤
	0005183	フマキラー ウッドテクトフロアブル	カルベンダジム クロロタロニル	1kg	2	㊦㊧	希釈倍率：64倍 FL剤

ステルスSC（BASF）



特 長

①忌避性なし
ーシロアリに直接かかるように散布しなくても通り道に処理しておくだけで被害部分のシロアリが死滅します。
②周辺密度低下
ー建物周辺にいるシロアリを殺し、密度を減らし再発を防ぐ。
③低臭性・刺激なし
ー不快な臭いや皮膚刺激がほとんどなく、蒸気圧が低く揮散しにくく、ホルムアルデヒドなど改定建築基準法に規制される化学物質などを含まない。
④優れた安定性と残効性
ー水に溶けにくく土壌中で安定している。土壌及び水の幅広いpH(pH 5～9)で分解しにくいため、環境への影響が少なく、残効性が長い。
⑤あらゆるシロアリに優れた効果
ーイエシロアリをはじめ、あらゆるシロアリに高い効果がある。

新しい系統の化合物
新しい作用性
新しい使用方法の・・・

お勧め



パワースプレーN

成 分： 4-プロモ-2-(4-クロロフェニル)-1-エトキシメチル-5-トリフルオロメチルピロール-3-カルボニトリル 21.44% (w/w)
容 量： 1 L
認 定：（社）日本しろあり対策協会
（社）日本木材保存協会
希釈倍率： 2 0 0 倍
区 分： 医薬用外劇物
（但し、水で200倍に希釈した散布液は普通物）

三共メトロフェン乳剤（ピレスロイド様化合物）



特 長

①安全性ー人畜及び魚類に対しての毒性が低い。
②残効性ーアルカリ土壌においても安定。

お勧め



パワースプレーN

成分： エトフェンブロックス 8% (w/w)
S-4 2 1 40% (w/w)
容量： 1 8 k g
認定：（社）日本しろあり対策協会、
（社）日本木材保存協会
希釈： 4 0 倍

メトロフェン乳剤の安全性

急性経口毒性(ラット)		LD50：> 5, 000mg/kg
急性経皮毒性(ラット)		LD50：> 2, 000mg/kg
刺激性 (ウサギ)	皮膚	やや強い刺激性
	眼	弱い刺激性

薬 剤

木部処理用防蟻剤

■ ハチクサン20WE



特 長

ネオニコチノイド系の非忌避性の殺虫剤なので、シロアリを効果的に薬剤へ接触させ、確実に致死させる“ドミノ効果”を発現します。
低濃度で高い効果が得られ、長期間の防蟻効果が期待できます。

有効成分： イミダクロプリド2.0%、シプロコナゾール2.0%
容 量： 900g
希釈倍率： 20倍
認 定： (社)日本しろあり対策協会
(社)日本木材保存協会

■ ステルスWT15



特 長

優れた防蟻効果：イエシロアリをはじめ、あらゆるシロアリに高い効果があります。
優れた防腐効果：殺菌剤の添加により、木材腐朽菌に対しても効果を発揮し、長時間建物を守ります。
環境への安全性：水に溶けにくく、土壌吸着が強い為、環境中にほとんど流出しません。

有効成分： クロルフェナピル3.3%、シプロコナゾール3.0%、IPBC3.0%
容 量： 1.2kg
希釈倍率： 15倍(ステルスWT15、1.2kgに対して水17L)
認 定： (社)日本しろあり対策協会
(社)日本木材保存協会

■ 三共ミケブロック乳剤



特 長

揮発性溶媒が主成分の油剤から乳剤に変更した為、VOCを98%以上削除と大幅に改善出来ました。
薬剤が油剤から乳剤に変更した事で臭いの元となっていた揮発性溶媒が大幅にカットされ、薬剤臭も大幅に抑えました。

有効成分： ジノテフラン5%、F-69 5%
容 量： 500mL
希釈倍率： 50倍
認 定： (社)日本しろあり対策協会、(社)日本木材保存協会

木部処理用防蟻剤

納期記号	商品コード	商品名	成分	容量	発注単位	区分	希釈倍率、用量、その他
	0005019	三共メトロフェン油剤	エトフェンブックス0.2%、S-421 1.5%、サンプラス1.2%		1	㊦㊵	原液 用量：塗布処理 300mL/m ²
	0005020	三共メトロフェン油剤 着色	エトフェンブックス0.2%、S-421 1.5%、サンプラス1.2%		1	㊦㊵	オレンジ色 用量：塗布処理 300mL/m ²
	0005267	金鳥シロネン油剤C	シラフルオフェン0.15%、シプロコナゾール0.1%		1	㊦㊵	原液 用量：塗布処理 300mL/m ²
	0005184	エコロフェン油剤(低臭性)(フマキラー)	エトフェンブックス0.3%、IPBC 1.0%	18L	1	㊦㊵	原液 用量：塗布処理 300mL/m ²
	0005185	ホルサー油剤無色(低臭性)(フマキラー)	ベルメトリン0.2%、MGK264、IPBC 1.0%	18L	1	㊦㊵	原液 用量：塗布処理 300mL/m ²
	0005297	ステルスWT15(BASF)	クロルフェナピル66%、シプロコナゾール5%、IPBC1.5%	1200g×1	1	㊦㊵	希釈倍率：15倍 用量：塗布処理 300mL/m ²
	0005015	三共ミケブロック乳剤(木部処理用)	ジノテフラン6%、F-69 5%	500mL	1	㊦㊵	希釈倍率：50倍 VOC対策の決定版 用量：塗布処理 300mL/m ²
	0005186	エコロフェンCW(フマキラー)	エトフェンブックス9%、シプロコナゾール3%	1kg	2	㊦㊵	希釈倍率：30倍 用量：塗布処理 300mL/m ²
	0005211	ハチクサン20WE	イミダクロプリド2%、シプロコナゾール2%	900g×10	1	㊦㊵	希釈倍率：20倍 水で希釈する乳剤タイプ 用量：塗布処理 300mL/m ²
	0005229	キシラモントラッド(日本エンパイロケミカルズ)	クロチアジン0.2%、プロピコナゾール1%、テブコナゾール1%	16L	1	㊦㊵㊶	原液 用量：(標準使用量) 4～5㎡/L 木部の防腐、及び木材害虫の予防、駆除

■ 三共メトロフェン油剤 (ピレスロイド様化合物)

特 長

- ①安全性ー人畜及び魚類に対しての毒性が低い。
- ②残効性ーアルカリに対しても安定。
- ③高い防腐・防黴効力の「サンプラス」を配合。

メトロフェン油剤の安全性

急性経口毒性 (ラット)		LD50：>5, 000mg/kg
急性経皮毒性 (ラット)		LD50：>2, 000mg/kg
刺激性 (ウサギ)	皮膚	軽度の刺激性
	眼	刺激性無し

成 分： エトフェンブックス 0.2%(W/W)
S-421 1.5%(W/W)、サンプラス 1.2%(W/W)

容 量： 18L

認 定： (社)日本しろあり対策協会
(社)日本木材保存協会

希釈倍率： 原液使用



(無色)



(オレンジ)



お勧め



カートスプレー
一斗缶(薬剤缶)をそのまま使い、付属の3.0mのホースで作業効率がup!

薬 剤

床下調湿剤、樹木用農薬

建 寿



特 長

湿気が多くなると吸湿し、少なくなると放湿して、湿度をコントロールします。
効果は長期間持続します。
工事は床下にまくだけで済み、簡単です。
非常に高い吸水率です（100～180％）。
不燃・無臭です。
乾燥しますので、衛生害虫や腐れの予防に役立ちます。

有効成分： トバモライト水和物（ケイ石と生石灰が反応、変化してできたもの）
容 量： 10kg

三共ディプテレックス乳剤



有効成分： DEP（PRTR法第1種-167号）50.0%
容 量： 500mL
希釈倍率： 街路樹1500倍、樹木類1000倍

床下調湿剤

納期記号	商品コード	商品名	成分	容量	発注単位	区分	希釈倍率、用量、その他
	0005272	建寿 1 0 kg	トバモライト	10kg	10		用法用量：10kg/3.3㎡、現場の状況が悪い場合は、適宜増量してください。
	0005277	ニチノーストーン 1 0 kg	天然鉱石ゼオライト	10kg	10	㊦	用法用量：33kg/3.3㎡ 施工厚15mm
	0005278	ウェットハンター 1 0 kg		10kg	10		

樹木用農薬

納期記号	商品コード	商品名	成分	容量	発注単位	区分	希釈倍率、用量、その他
	0006912	三共ディプテレックス乳剤	DEP50.0%	500mL	20	農	街路樹1500倍、樹木1000倍
	0006951	新グラミン展着剤	※備考参照	500mL	1	農	用法用量：1～3mL / 10L、※ポリオキシエチレンドデシルエーテル10.0%、ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル10.0%、リグニンスルホン酸カルシウム12.0%